

TETRACYKLIN

Hvordan virker tetracyklin?

Tetracykliner (tetracyklin, oxytetracyklin og doxycyklin) er antibiotika, som hæmmer bakterievækst. De dæmper også betændelseslignende tilstande, som ikke er fremkaldt af bakterier. Tetracyklin anvendes bl.a. til behandling af acne og lignende hudlidelser. Tetracyklin bindes til kalk (fx. i mælkeprodukter), jern, zink, magnesium og aluminium (fx. i syreneutraliserende medicin). Samtidig indtagelse af tetracyklin og disse stoffer medfører, at tetracyklin ikke opses i tarmen, og virkningen nedsættes/udebliver.

Hvordan tages tetracyklin?

I tabletform 1-2 gange daglig med vand og sammen med et let måltid uden mælk og lignende. Mælkeprodukter kan indtages 1-3 timer før eller efter tetracyklintabletterne, uden at tetracyklinbehandlingen påvirkes.

Tetracyklin og anden medicin

Under antibiotikabehandling for infektion med penicillin og lignende præparater bør tetracyklinbehandlingen stoppes, og den kan senere genoptages. Roaccutan® og Neotigason® må ikke tages under tetracyklinbehandling. Blodfortyndende medicin (Coumarin® og lignende) må kun efter aftale med lægen tages sammen med tetracyklin.

Bivirkninger

Tetracyklin ændrer også tarmens naturlige bakterieflora. Denne ændring kan give forbigående luft i maven eller let forstoppelse/diaré. Kommer der betydelig og længerevarende diaré, bør tetracyklinbehandlingen stoppes og hudlægen kontaktes. Hos kvinder kan tetracyklin ligesom andre antibiotika medføre ændring i skedens bakterieflora med overvækst af gærsvampe. I enkelte tilfælde viser det sig

som svie og udflåd, der kræver svampebehandling. Tal med hudlægen herom. I sjældne tilfælde ses øget lysfølsomhed med udslæt.

Prævention, graviditet og amning

Kvinder, der tager p-piller, kan risikere, at p-pillerne ikke er sikre den første måned under tetracyklinbehandlingen. I denne periode bør p-piller suppleres med anden form for svangerskabsbeskyttelse, samtidig med at p-pillebehandlingen fortsættes. Tetracyklin må ikke tages under graviditet og amning. Under langvarig tetracyklinbehandling tilrådes vitamintilskud med almindelige multivitamin-tabletter.

Venlig hilsen

Hudklinikken v/ Charles Kromann