

Aldara (Imiquimod)

Aldara er en medicin til behandling af vorter, hudkræft og forstadier til hudkræft. Den anvendes topisk og brugsanvisningen afhænger af den specifikke tilstand, der behandles. Der er to primære behandlingsforløb: et for aktiniske keratoser (solbeskadiget hud) og et andet for basalcellecarcinom (en type hudkræft).

Instruktioner til påføring:

Vask de ønskede områder med mild sæbe og tør dem.

Vask dine hænder før påføring.

Åbn en Aldara-pakke og påfør lidt på din fingertip.

Påfør Aldara på det berørte område og lidt omkring det.

Massér cremen ind, indtil den ikke ses længere.

Dæk ikke det behandlede område.

Vask dine hænder efter påføring.

Opbevar ubrugte Aldara-pakker i køleskabet.

Behandling af aktiniske keratoser:

Påfør Aldara om aftenen i 8 timer.

Brug Aldara 3 gange ugentligt i 4 uger.

Følg op med lægeaftale.

Forvent rødme som tegn på virkning.

Hold pause ved alvorlig hudirritation.

Behandling af basalcellecarcinom:

Påfør Aldara om aftenen i 8 timer.

Brug Aldara dagligt i 6 uger (mandag til fredag).

Følg op med lægeaftale.

Forvent rødme som tegn på virkning.

Hold pause ved alvorlig hudirritation.

Bivirkninger:

Bivirkninger er relateret til virkningsmekanismen:

Sårdannelse på påføringsstedet.

Hovedpine, influenzalignende symptomer, muskelsmerter, mavesmerter.

Graviditet og Amning:

Aldara må ikke bruges under graviditet eller amning. Rådfør dig med sundhedspersonale.

Mvh

Hudklinikken v/Charles Kromann, Holbækvej 108, 4000 Roskilde