

Glycopyrrolat

Hvad er Glycopyrrolat?

Glycopyrrolat er et lægemiddel der nedsætter aktiviteten i kirtler. Virkningen udnyttes blandt andet ved øget svedproduktion.

Hvordan tages medicinen?

Det anbefales generelt, at du indtager medicinen i lavest mulige, effektive dosis. Som udgangspunkt anbefales nedenstående dosering.

- Uge 1: 1 tablet dgl.
- Uge 2: 2 tabletter dgl. (eks. 1 tablet morgen og 1 tablet aften)
- Uge 3: 3 tabletter dgl.
- Uge 4: 4 tabletter dgl.

Tabletterne kan fordeles af 2 omgange som ovenstående eksempel eller tages på en gang.

Bemærk

Bør indtages 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid.

Hvem kan behandles?

Du må ikke indtage Glycopyrrolat, hvis du lider af grøn stær, urinretention, alvorlige mavetarmsygdomme, myastenia gravis eller blødningsbetinget hjertesygdom.

Hvilke almindelige bivirkninger kan forekomme?

Mundtørhed, forstoppelse, træthed, synsforstyrrelser, hudtørhed og hovedpine er dosisafhængige og oftest forbigående.

Bør ikke anvendes ved graviditet og amning.

Regelmæssig tandlægekontrol anbefales pga. nedsat spytkproduktion.