

Patientinformation om Dalacin og Rimactan mod svær acne eller hidrosadenitis

Formål: Dalacin (Clindamycin) og Rimactan (Rifampicin) bruges til at behandle svær acne og hidrosadenitis ved at reducere inflammation og bekæmpe bakterier.

Dosering: Tag 300 mg af hver præparat morgen og aften. Der behandles mindst 3 måneder.

Forventet effekt: Forbedring ses ofte inden for nogle uger, men fuld effekt kan tage flere måneder. Fortsæt behandlingen som foreskrevet.

Mulige bivirkninger:

- **Dalacin:** Mavebesvær, diarré, udslæt, allergiske reaktioner.
- **Rimactan:** Leverpåvirkning, rød-orange farvning af kropsvæsker, influenzalignende symptomer, appetitløshed, mavesmerter.

Blodprøver: Få taget blodprøver hver måned for at overvåge leverfunktionen. De bestilles af hudlægen og kan tages hos egen læge eller på hospitalet.

Vigtige råd:

- Informer lægen om bivirkninger eller nye symptomer.
- Undgå alkohol.

Kontakt din læge ved spørgsmål eller bekymringer.

Mvh

Hudklinikken ved Charles Kromann
Tel: 69156116 - www.kromannhud.dk