

Rinvoq® (Upadacitinib) - Kortfattet Patientinformation

Indikation:

Rinvoq anvendes til behandling af inflammatoriske sygdomme som svær atopisk eksem, leddegigt og psoriasisgigt. Det gives til patienter, hvor andre behandlinger ikke er tilstrækkelige eller forårsager uacceptable bivirkninger. Lægemidlet kan anvendes af voksne samt børn over 12 år, men personer over 65 år med forhøjet risiko for hjerte-kar-sygdomme, kræft eller tidligere rygning bør vurderes nøje.

Virkningsmekanisme

Rinvoq virker som en JAK-hæmmer, der reducerer betændelse ved at blokere specifikke signalstoffer i immunsystemet. Dette hjælper med at kontrollere symptomer som kløe og hududslæt ved atopisk eksem og betændelse ved ledsygdomme.

Dosering

Rinvoq tages én gang dagligt, som regel i doser på 15-30 mg. Justering af dosen kan ske afhængigt af effekt og bivirkninger. Din læge vil fastsætte den optimale dosis.

Blodprøver før og under behandling:

Blodprøver tages før behandlingsstart og hver 4. uge i de første 3 måneder. Herefter hver 8.-12. uge.

Bivirkninger:

- Meget almindelige bivirkninger: Infektioner i luftvejene (som halsbetændelse og bihulebetændelse), forhøjet kolesterol, hovedpine og kvalme.
- Almindelige bivirkninger: Urinvejsinfektioner, akne, forhøjede lever- eller muskelenzymer, vægtøgning, udslæt og influenzalignende symptomer.
- Mindre almindelige bivirkninger: Helvedesild, blodpropper i benene, forhøjede blodtryksniveauer og mundhulesvamp.

Rejse og forsikring

Ved planlagt udlandsrejse de første 6 måneder efter behandlingsstart skal der søges forhåndsgodkendelse fra dit forsikringsselskab.

Graviditet og prævention

Rinvoq må ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder. Prævention skal anvendes under behandlingen og mindst 4 uger før planlagt graviditet.

Vaccination

Undgå levende vacciner under behandlingen. Årlig influenzavaccination anbefales, og pneumokokvaccination bør overvejes for patienter over 65 år eller med risiko for lungebetændelse.

Kirurgi

Ved planlagte operationer bør du drøfte med din læge, om der er behov for midlertidig pause i behandlingen.