

Oxybutynin mod svedtendens

Oxybutynin er et lægemiddel, der normalt anvendes til behandling af overaktiv blære, men det kan også hjælpe med at reducere overdreven svedtendens (hyperhidrose).

Administration

Startdosis er 5 mg, der kan tages 1 gang dagligt den første uge og anden uge kan øges til to gange dagligt. Det er også muligt at halvere piller, hvis de har delekærv.

Bivirkninger

Almindelige bivirkninger inkluderer mundtørhed, forstoppelse, sløret syn og døsighed. Mindre almindelige bivirkninger kan være svimmelhed, kvalme og hovedpine. Sjældne bivirkninger inkluderer forvirring, hallucinationer og hjertebanken.

Advarsler

Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion, glaukom, myasthenia gravis eller gastrointestinale problemer bør være særligt opmærksomme. Alkohol kan forstærke bivirkningerne og bør undgås.

Graviditet og amning

Der er ikke påvist skadelige virkninger på foster eller småbørn, men det frarådes at tage medicinen under graviditet. Da mælkekirtler er modificerede svedkirtler kan man forestille sig at mælkeproduktionen nedsættes.

Blodprøver og opfølgning

Der er ikke behov for blodprøver under behandlingen, men informér lægen om eventuelle vedvarende eller alvorlige bivirkninger.

Mvh

Hudklinikken v/Charles Kromann, Holbækvej 108, 4000 Roskilde